



PRINCIPALI SOLUZIONI: POSIZIONAMENTO IDEALE

AVVERSITÀ													
PERONOSPORA <i>(Plasmopara viticola)</i>						Electis[®] Trio WDG							
				Zoxium[®] F PACK		OPPURE	Zoxium[®] PRO PACK						
				Reboot[®]				Electis[®] R FLOW					
				Fantic[®] F NC WG				Fantic[®] F NC WG					
				Kasko[®] Met									
				Genkotsu[®]				Genkotsu[®]					
				linea Airone <small>Attività collaterale contro Escoriosi</small>									
OIDIO <i>(Uncinula necator)</i>				Ibisco[®]									
				Antene[®] S									
				Domark[®] 125 Plus				IN STRETTA ALTERNANZA CON	Nabucco[®]				
				Regnum[®] 25 EC				Regnum[®] 25 EC					
BOTRITE <i>(Botrytis cinerea)</i>								Remedier <small>Efficace anche contro Marciume acido</small>					
				Fantic[®] F NC WG		OPPURE	Zoxium[®] F PACK		OPPURE	Electis[®] Trio WDG			
Altre avversità	Remedier	MAL DELL'ESCA		TRIPIDI, ACARI, ERIOFIDI	Dicarzol[®] 50 SP	UVA DA TAVOLA		PARASSITI VARI		Fitopyr[®] 2EC PRO			
			TIGNOLE	Astrel[®] WDG									
				TIGNOLE E CICALINE (COMPRESO SCAFOIDEO)				Glorial[®] 25 EC					
Efficienza trattamenti			MAGO[®] <small>Coadiuvante speciale in miscela con Fungicidi e Insetticidi</small>										

DIFESA VITE: tante soluzioni d'eccellenza per una produzione sostenibile

ZOXIUM® F PACK



COMBI-PACK: Movida (0,7 L) + Foliane SC (2 L)
Zoxamide 240 g/l + Folpet 500 g/l
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1 combi-pack per 1 Ha



ZOXIUM® PRO PACK



TWIN-PACK: Movida (0,7 L) + Cuneb (2,5 L)
Zoxamide 240 g/l + Fosfonato di K 790 g/l
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1 twin-pack per 1 Ha



ELECTIS® TRIO WDG



FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Zoxamide 3,6% + Cimoxanil 2,8% + Fosetil Al 35%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 4-5 kg/ha



REBOOT®



FORMULAZIONE Granuli dispersibili
Zoxamide 33% + Cimoxanil 33%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 400-450 g/ha



FANTIC® F NC WG



FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Benalaxyl-M 3,75% + Folpet 48%
INTERVALLO DI SICUREZZA 28 gg.
DOSE D'IMPIEGO 2 kg/ha

AIRONE® PIÙ WG



FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Rame ossicloruro 14% + Rame idrossido 14%
INTERVALLO DI SICUREZZA 20 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1,7-2,7 kg/ha



BUSSOLA® WG



FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Rame solfato neutralizzato con calce spenta 20%
INTERVALLO DI SICUREZZA 21 gg.
DOSE D'IMPIEGO 3,5-5 kg/ha



REMEDIER®



FORMULAZIONE Polvere bagnabile
Trichoderma asperellum 2% + T. gamsii 2% - min. 3x10⁷ UFC/g
INTERVALLO DI SICUREZZA 3 gg.
DOSE D'IMPIEGO 1 kg/ha



DOMARK® 125 PLUS



FORMULAZIONE Microemulsione
Tetraconazolo (125 g/l) 11,6%
INTERVALLO DI SICUREZZA 30 gg.
DOSE D'IMPIEGO 240 ml/ha

IBISCO®



FORMULAZIONE Liquida
COS-OGA (12,5 g/l) 1,25%
INTERVALLO DI SICUREZZA 0 (zero) gg.
DOSE D'IMPIEGO 2-3 L/ha



ASTREL® WDG



FORMULAZIONE Granuli idrodispersibili
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, ceppo ABTS 351 54%
INTERVALLO DI SICUREZZA -
DOSE D'IMPIEGO 50-100 g/hl



FITOPYR® 2EC PRO



FORMULAZIONE Concentrato emulsionabile
Piretrine (18,61 g/l) 2%
INTERVALLO DI SICUREZZA 1 gg.
DOSE D'IMPIEGO max 160 ml/hl



PRODOTTO	COMPOSIZIONE	FORM.	INTERVALLO DI SICUREZZA	DOSE
AIRONE® LIQUIDO	Rame metallo (272 g/l) 20% (ossicloruro 10% + idrossido 10%)	SC	20 gg.	2-4 L/ha
ANTENE® S	Zolfo 56,09% (800 g/l)	SC	5 gg.	3-4 L/ha
CUNEB®	Fosfonato potassio (790 g/l) 54,5%	LS	15 gg.	0,75-2,5 L/ha
ELECTIS® R FLOW	Zoxamide (40 g/l) 2,85% + Rame (solfato tribasico) (266 g/l) 19,1%	SC	28 gg.	3 L/ha
GENKOTSU®	Amisulbrom (200g/l) 17,7%	SC	28 gg	375 ml/ha
HATRICK® 30 WG	Rame solfato tribasico 30%	WDG	21 gg.	1,4-1,8 kg/ha
KASKO® MET	Metalaxil 25%	PB	14 gg.	0,8 kg/ha
NABUCCO®	Metrafenone (500 g/l) 42,37%	SC	28 gg.	0,25 L/ha
REGNUM® 25 EC	Pyraclostrobin (250 g/l) 23,6%	EC	35 gg. vite da vino 49 gg. vite da tavola	0,4 L/ha
DICARZOL® 50 SP Uva da tavola	Formetanate 50%	PB-SI	Inizio fioritura	1 kg/ha
GLORIAL® 25 EC	Deltametrina (25 g/l) 2,8%	EC	7 gg.	0,5-0,7 L/ha

MAGO®

Per migliorare l'efficienza dei trattamenti fungicidi e insetticidi, aggiungere il coadiuvante speciale Mago (tensioattivo-adesivante, antischiuma e antideriva) anche in Agricoltura Biologica.



Agrofarmaci autorizzati dal Ministero della Salute. Usare con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

GOWAN ITALIA S.r.l. · Faenza (RA) · Tel. 0546 629911
gowanitalia@gowanitalia.it · www.gowanitalia.it

Gowan
ITALIA
l'affidabilità in agricoltura