

PROLECTUS™

(GRANULI IDRODISPERSIBILI)

FUNGICIDA PER LA LOTTA CONTRO LA MUFFA GRIGIA DELLA VITE E DELLE COLTURE ORTICOLE
COLTIVATE IN SERRA

Meccanismo d'azione: FRAC G17

PROLECTUS™

Registrazione del Ministero della Salute n.15125 del 13/07/2012

COMPOSIZIONE:

Fenpyrazamine g 50

Coformulanti q. b. a g 100

© Marchio registrato Sumitomo Chemical Company - Osaka (Giappone)

Stabilimenti di produzione:

ISAGRO SpA - Via Nettunense Km 23,400 - Aprilia (LT)

SBM-Formulation - CS 621 av. Jean Foucault 34533 Beziers - Francia

INDALVA S.L.

Ctra de la Matanza Km 0,5 - E-03300 Orihuela (Alicante) Spagna

Schirm GmbH

Mecklenburger Strasse 229 - 23568 Lubeca (Germania)



ATTENZIONE

Partita n.

Contenuto:
0,500-1-3-5-10-20 Kg

**SUMITOMO CHEMICAL AGRO
EUROPE S.A. S**

10A Rue de la Voie Lactée
69370 Saint-Didier-Au-Mont-D'Or
(Francia)
Tel. +33 478643260

Distribuito da:
SUMITOMO CHEMICAL ITALIA Srl
Via Caldera, 21 - Milano
Tel. 02 45280.1

INDICAZIONI DI PERICOLO: H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

CONSIGLI DI PRUDENZA: P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

PREVENZIONE: P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente.

REAZIONE: P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito.

CONSERVAZIONE: P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

SMALTIMENTO: P501 Smaltire il prodotto / recipiente in accordo alle norme vigenti sui rifiuti pericolosi.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI: EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Attenzione: Conservare in ambiente fresco, asciutto e ben ventilato.

INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

CARATTERISTICHE

Fungicida per il controllo della Botrite della vite e delle colture orticole (pomodoro, melanzana, peperone, cetriolo, cetriolino e zucchini) coltivate in serra. Il prodotto non è sistemico sebbene presenti attività traslaminare.

DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO

COLTURA PROTETTA DI POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, CETRIOLO, ZUCCHINO (in serra): contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) intervenire alle dosi riportate in tabella, iniziando i trattamenti all'instaurarsi delle condizioni favorevoli alla malattia. Adottare un intervallo fra i trattamenti di 8 - 12 giorni, in funzione della pressione della malattia.

VITE DA TAVOLA E DA VINO: contro Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) si consiglia un trattamento in pre-chiusura del grappolo o uno all'invaiaura o in pre-raccolta.

Per evitare l'insorgenza di popolazioni del fungo resistenti è necessario rispettare il numero massimo di interventi indicato in tabella, e alternare il prodotto con altri a diverso meccanismo d'azione. Bagnare accuratamente ed uniformemente la vegetazione da proteggere. Le dosi d'impiego (g/hl) indicate in tabella si riferiscono a trattamenti con volumi d'acqua di 10 hl/ha; con volumi di acqua inferiori o superiori adeguare la dose di prodotto per ettolitro di acqua in modo da rispettare la dose per ettaro indicata nella suddetta tabella

Adottare le dosi più alte e l'intervallo più breve con elevata pressione della malattia.

Non superare la dose massima per ettaro ed il numero di trattamenti indicati in tabella.

Preparazione della miscela: Riempire a metà con acqua il serbatoio dell'irroratrice e mettere in funzione l'aggitatore, quindi introdurre il quantitativo di prodotto previsto e completare il riempimento con acqua. Durante la distribuzione mantenere la massa in agitazione.

COLTURA	MALATTIA	DOSE g/hl	DOSE kg/ha	Numero massimo di trattamenti consentito per anno	Intervallo tra i trattamenti
Orticole in serra: Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchini	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	80-120	0,8-1,2	3	8-12 giorni
Vite da vino e da tavola	Muffa grigia (<i>Botrytis cinerea</i>)	100	1	1	---

Il prodotto si impiega da solo.

Sospendere i trattamenti: 3 giorni prima della raccolta su colture orticole; 14 giorni prima della raccolta su vite da vino e 7 giorni su uva da tavola.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI.

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA.

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO.

DA NON VENDERSI SFUSO.

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO.