

CIDELY®

Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

- Cyflufenamid 5,1% (51,3 g/l)

- Coformulanti: quanto basta a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2-benzisothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO
Tel. +39 (0)2 334441

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15449 del 22.06.2012

Stabilimenti di produzione:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Sipcam Oxon SpA., Salerano S/Lambro (LO)

Althaller Italia srl, San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. - Enofyta (Grecia)

Contenuto netto: ml 50-100-250-500 - Litri 1-5-10

Partita n.: vedi corpo della confezione

© marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE

Il prodotto in formulazione EW (emulsione olio acqua) contiene Cyflufenamid, uno specifico fungicida antioidico per il controllo di varie specie di Oidio (Mal bianco).

Efficace contro oidio della vite da vino e da tavola (*Uncinula necator*) e del melo (*Podosphaera leucotricha*) e delle drupacee (*Sphaerotheca pannosa*). Cyflufenamid è il capostipite della famiglia chimica degli Amidoxidimes, ed è dotato di un nuovo meccanismo d'azione.

Non manifesta fenomeni di resistenza incrociata con le attuali molecole chimiche antioidiche.

Il prodotto è dotato di una perfetta selettività nei confronti dell'artropodofauna utile, dei fitoseidi in particolare.

CAMPI, DOSI E MODALITA' DI IMPIEGO

Vite da vino e da tavola: 40-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Uncinula necator*). Impiegare 8-10 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.

Intervenire in modalità preventiva indicativamente dall'inizio della fioritura (avendo utilizzato in precedenza prodotti antioidici specifici) fino ad ingrossamento acini ad intervalli di 10-14 giorni.

Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Melo: 30-50 ml/hl per il controllo di oidio (*Podosphaera leucotricha*).

Impiegare 9-15 hl/ha rispettando la dose di 500 ml/ha.

Intervenire in modalità preventiva ad intervalli di 7-10 giorni dalle prime foglie espanse alla pre-raccolta.

Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

Drupacee (Pescio, Nettarine e Albicocco): 50-100 ml/hl per il controllo di oidio (*Sphaerotheca pannosa*).

Intervenire in modalità preventiva a partire da dopo la fioritura fino alla pre-raccolta alla dose di 500 ml/ha. Se necessario, ripetere il trattamento con lo stesso prodotto (CIDELY) intervenendo non prima di 7 giorni.

Effettuare al massimo 2 interventi all'anno.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

Riempire il serbatoio dell'irroratrice fino a metà, aggiungere la quantità di prodotto necessaria con agitatore in movimento e quindi riempire il serbatoio.

Irrorare la vegetazione in tempi brevi dalla preparazione della miscela mantenendo l'agitatore sempre in movimento.

FITOTOSSICITÀ

Il prodotto non ha mai manifestato effetti fitotossici sulle colture in etichetta.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta:

21 giorni per la vite; 14 giorni per il melo e le drupacee.

ATTENZIONE

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta; Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato; Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali; Non applicare con i mezzi aerei; Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso; Operare in assenza di vento; Da non vendersi sfuso; Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente; Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 7 dicembre 2021

CIDELY

**Fungicida antioidico
in formulazione emulsione acquosa.**

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

- Cyflufenamid 5,1% (51,3 g/l)

- Coformulanti: quanto basta a g 100



ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso. EUH208 Contiene 1,2 -benzisothiazol-3-one. Può provocare una reazione allergica. EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P273 Non disperdere nell'ambiente. P391 Raccogliere la fuoriuscita. P332+P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. P501 Smaltire il contenuto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Syngenta Italia S.p.A.
Viale Fulvio Testi 280/6 - MILANO
Tel. +39 (0)2 334441

Autorizzazione Ministero della Salute n. 15449 del 22.06.2012

Stabilimenti di produzione:

Kwizda Agro GmbH, Leobendorf (Austria)

Sipcam Oxon SpA., Salerano S/Lambro (LO)

Althaller Italia srl, San Colombano al Lambro (MI)

Stabilimento di confezionamento:

Syngenta Hellas Single Member S.A.C.I. - Enofyta (Grecia)

Contenuto netto: ml 50-100

Partita n.: vedi corpo della confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade].

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.

AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON
DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**