

# HELIOSOUFRE S

- FUNGICIDA ED ACARICIDA A BASE DI ZOLFO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA -

## HELIOSOUFRE S

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

ZOLFO puro (esente da selenio) g 51,7 (700 g/l)

Coformulanti, q.b. a g 100

### Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari

### Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



PERICOLO

### Titolare dell'autorizzazione:

**ACTION PIN S.A.**

30 rue Gambetta – 40100 DAX (Francia) – Tel.: +33 05 58550700

**Distribuito da: CBC (EUROPE) S.r.l.** – Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035-335315

**Officine di produzione: S.I.P.C.** – Rue J. Coste – COURCHELETTES (Francia)

**Officine di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A.** – S.S. Cremasca 591 N.10 – 24040 Fornovo S Giovanni (BG)

**Registrazione del Ministero della Sanità N. 11102 del 29.11.2001**

**Contenuto netto:** ml 1 – 100 – 250 – 500; l 1 – 2 – 5 – 10 – 20 – 50 – 300 – 600

**PARTITA N°** .....

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non lavare le attrezzature per l'applicazione in prossimità di acqua di superficie. Evitare la contaminazione tramite canali di scolo da cortili e strade.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio è necessario utilizzare ugelli che riducano la deriva del:

- 90% per trattamenti precoci nei frutteti;

- 75% per trattamenti tardivi nei frutteti;

- 50% per trattamenti sulla vite, su orticole varie, rosa e ornamentali.

Coltura	Utilizzo di ugelli che riducano la deriva del (%)	O IN ALTERNATIVA	Utilizzo di misure di mitigazione* quali ugelli anti-deriva, siepe, trattamento verso l'interno dell'ultima fila che riducano la deriva complessivamente del (%)
Frutteto Trattamenti precoci	90		90
Frutteto Trattamenti tardivi	75		75
Vite	50		50
Orticole e Ornamentali Alte (> 50cm)	50		50

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

### CATATTERISTICHE

HELIOSOUFRE S è un formulato ad azione fungicida ed acaricida. La sua originale formulazione a base di zolfo micronizzato assicura elevata efficacia, persistenza di azione e sicurezza del trattamento. Tale formulazione garantisce una eccellente distribuzione ed adesività sulla vegetazione trattata ed un'ottima resistenza all'azione dilavante della pioggia. Il prodotto, per le sue favorevoli caratteristiche, è rispettoso dell'entomofauna utile.

### EPOCA, MODALITÀ E DOSI D'IMPIEGO

Coltura	Avversità	Dose (l/ha)	Acqua l/ha	N. trattamenti	Intervallo	Epoca d'impiego
Vite (da vino e da tavola)	Oidio	3-5	200-1000	2-12	7 gg	Dalle prime foglie distese fino all'invaiaatura
	Erinosi e Acariosi	7,5	80-1000	1-4	7 gg	Da gemma cotonosa a invaiatura
Pomacee (melo e pero)	Oidio	3-5	500-1500	2-12	7 gg	Pre e post fioritura
	Ticchiolatura	2-7	500-1500	2-12	7 gg	Pre e post fioritura
Drupacee (Albicocco, pesco e nettarine)	Oidio	3-5	500-1500	2-12	7 gg	Da post fioritura a prima della maturazione
Susino	<i>Taphrina sp.</i>	1,25-6	500-1500	1-4	7 gg	Trattamenti invernali e ad inizio primavera
Nocciolo	Oidio	3,5-5	500-1500	1-11	7 gg	Dal germogliamento all'ingrossamento dei frutti
Olivo	Acari	1-6	500-1500	2-6	7 gg	Da inizio infestazione
Frumento, Orzo, Avena Triticale	Oidio	4-5	80-250	1-2	10 gg	Da accestimento a inizio spigatura
Barbabetola da zucchero	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa

e da foraggio						
Soia	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa
Girasole	Oidio	4-5	200-500	1-2	10 gg	Durante la stagione vegetativa
Pomodoro (in pieno campo e in serra)	Acari ( <i>Aculops lycopersici</i> )	1,5-7	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Patata	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Orticole varie* (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Fragola (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	300-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa
Rosa (Impiego in pieno campo e serra), Forestali, Ornamentali (Impiego in pieno campo e serra)	Oidio	1,5-3	500-1000	2-6	7 gg	Durante la stagione vegetativa

\*Orticole varie: *Bietole, Carciofo, Carota, Cavolo, Cetriolo, Cocomero, Melone, Cicoria, Indivia, Indivia riccia, Lattuga, Crescione, Scarola, Valerianella, Melanzana, Peperone, Pisello (da industria), Prezzemolo, Scorzonera, Sedano, Tarassaco, Zucchino.*

#### AVVERTENZA

Non trattare in fioritura: non superare le dosi massime indicate. Per proteggere le piante non bersaglio, non applicare il prodotto quando le temperature superano i 30°C.

Dopo il trattamento con HELIOSOUFRE S risciacquare accuratamente le attrezzature utilizzate, soprattutto i polverizzatori a bassa pressione. Conservare il prodotto nella confezione originale protetto dal gelo.

#### PREPARAZIONE DELLA MISCELA

Riempire i 2/3 della botte con acqua. Versare la dose prestabilita di HELIOSOUFRE S. Sotto agitazione aggiungere altri eventuali prodotti complementari. Completare il riempimento della botte.

#### COMPATIBILITÀ

Introdurre il prodotto per primo nella botte. HELIOSOUFRE S non è compatibile con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.), con olii minerali, con captano.

**Avvertenza** - il formulato deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del captano. In caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** può arrecare danno alle seguenti cultivar: mele (Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla bianca, Commercio, Jonathan, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap, Golden delicious e le sue cultivar clone), pere (Buona Luigia D'Avranches, Contessa di Parigi, Kaiser Alexander, Olivier de Serres, Decana del Comizio) ed alle Cucurbitacee, su alcune cultivar di melone; si raccomanda pertanto di effettuare saggi preliminari prima dell'impiego.

#### SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA

#### ATTENZIONE

- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Da non applicare con mezzi aerei
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- **Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da lt 50, 300 e 600 dev'essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.**

# HELIOSOUFRE S

- FUNGICIDA ED ACARICIDA A BASE DI ZOLFO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA -

## HELIOSOUFRE S

### COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

ZOLFO puro (esente da selenio) g 51,7 (700 g/l)

Coformulanti, q.b. a g 100

### Indicazioni di pericolo

H318 Provoca gravi lesioni oculari

### Consigli di prudenza

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280 Indossare guanti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.



**PERICOLO**

### Titolare dell'autorizzazione:

**ACTION PIN S.A.**

30 rue Gambetta – 40100 DAX (Francia) – Tel.: +33 05 58550700

**Distribuito da: CBC (EUROPE) S.r.l.** – Via Zanica, 25 – 24050 Grassobbio (BG) – Tel 035-335315

**Officine di produzione: S.I.P.C.** – Rue J. Coste – COURCHELETTES (Francia)

**Officine di confezionamento: I.R.C.A. Service S.p.A.** – S.S. Cremasca 591 N.10 – 24040 Fornovo S Giovanni (BG)

**Registrazione del Ministero della Sanità N. 11102 del 29.11.2001**

**Contenuto netto:** ml 1 – 100

**PARTITA N°** .....

### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non lavare le attrezzature per l'applicazione in prossimità di acqua di superficie. Evitare la contaminazione tramite canali di scolo da cortili e strade.

Per proteggere gli artropodi non bersaglio è necessario utilizzare ugelli che riducano la deriva del:

- 90% per trattamenti precoci nei frutteti;

- 75% per trattamenti tardivi nei frutteti;

- 50% per trattamenti sulla vite, su orticole varie, rosa e ornamentali.

Coltura	Utilizzo di ugelli che riducano la deriva del (%)	O IN ALTERNATIVA	Utilizzo di misure di mitigazione* quali ugelli anti-deriva, siepe, trattamento verso l'interno dell'ultima fila che riducano la deriva complessivamente del (%)
Frutteto Trattamenti precoci	90		90
Frutteto Trattamenti tardivi	75		75
Vite	50		50
Orticole e Ornamentali Alte (> 50cm)	50		50

### INFORMAZIONI MEDICHE

In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso. **Consultare un centro antiveleni.**

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**